

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

地域の感染レベル	身体的距離の確保	感染リスクの高い 教科指導	部活動等 (自由意思の活動)
レベル3	できるだけ2m程度 (最低1m)	行わない	個人や少人数でのリスクの低い活動で短時間での活動に限定
レベル2	1mを目安に 学級内で最大限の 間隔をとること	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;"> 収束局面 ↓ </div> <div style="text-align: center; margin-right: 5px;"> 感染リスクの低い活動から徐々に実施 </div> <div style="text-align: left; margin-left: 5px;"> ↑ 拡大局面 </div> </div>	感染リスクの高い活動を停止 リスクの低い活動から徐々に実施し教師等が活動状況の確認を徹底
レベル1	1mを目安に 学級内で最大限の 間隔をとること	適切な感染対策を行った上で実施	十分な感染対策を行った上で実施

(参考)

本マニュアル	新型コロナウイルス感染症分科会提言(※)における分類		
レベル3	ステージⅣ	爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階	(病院間クラスター連鎖などの大規模かつ深刻なクラスター連鎖が派生し、 爆発的な感染拡大 により、高齢者や高リスク者が大量に感染し、多くの重傷者及び死亡者が発生し始め、 公衆衛生体制及び医療提供体制が機能不全に陥ることを避けるための対応が必要な状況。)
レベル2	ステージⅢ	感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階	(ステージⅡと比べてクラスターが広範囲に多発する等、 感染者が急増し、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制への負荷がさらに高まり、一般医療にも大きな支障が発生することを避けるための対応が必要な状況。)
	ステージⅡ	感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階	(3密環境などリスクの高い場所でクラスターが度々発生することで、 感染者が漸増し、重傷者が徐々に増加してくる。 このため、保健所などの 公衆衛生体制の負荷も増大するとともに、 新型コロナウイルス感染症に対する医療以外の一般医療も並行して実施する中で、 医療体制の負荷が蓄積しつつある。)
レベル1	ステージⅠ	感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階	